



 **GRUPO CAHT**  
GRUPO COOPERATIVO ARGENTINO  
DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS

# COVID-19 TIPS DE INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES

## EXACERBACIÓN DE TROMBOCITOPENIA INMUNE LUEGO DE VACUNA CONTRA COVID-19



Un estudio evaluó prospectivamente a 52 pacientes con trombocitopenia inmune crónica luego de la vacunación anti COVID-19. El 12 % (n=6) presentó exacerbación de la trombocitopenia con desarrollo de sangrado, con una mediana de tiempo desde la vacunación de dos días, y de recuento de plaquetas de 2.000/mm<sup>3</sup>. Los seis pacientes con exacerbación requirieron tratamiento (corticoides +/- Inmunoglobulina G EV) y cinco de ellos presentaron una rápida respuesta terapéutica (mediana de 3 días). El autor propone considerar evaluar, con un recuento de plaquetas entre el día 3 a 7 post vacunación, a los pacientes con alto riesgo de sangrado, como a los anticoagulados, y a los que presenten antecedentes de trombocitopenia inmune inducida por vacunas.

---

### Bibliografía:

Br J Haematol 2021 Jun 1. doi: 10.1111/bjh.17645.