



GRUPO CAHT  
GRUPO COOPERATIVO ARGENTINO  
DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS

# Tromboembolismo y embarazo

## TIPS DE INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES

### PROFILAXIS DE ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA EN EL EMBARAZO EN PACIENTES CON TROMBOSIS PREVIAS



En las pacientes con antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa (ETE) idiopática o relacionada con estrógenos, las guías ACCP y ACOG recomiendan la trombopprofilaxis farmacológica desde el diagnóstico del embarazo y hasta las primeras 6 semanas del puerperio. En las pacientes con antecedentes de ETE por un factor de riesgo transitorio (distinto a los estrógenos), las guías sugieren la trombopprofilaxis en el puerperio (hasta 6 semanas), aunque podría considerarse su indicación durante el embarazo si el evento trombótico fue desproporcionado al factor de riesgo transitorio.

#### Bibliografía:

Diana Penschky y Beatriz Grand. Prevención del tromboembolismo venoso en el embarazo. Hemostasia y Trombosis en la Mujer: tromboembolismo venoso en embarazo y técnicas de reproducción asistida. Pag. 79-98. Grupo CAHT, 2018.

Bates SM y col. Guidance for the treatment and prevention of obstetric-associated venous thromboembolism. J Thromb Thrombolysis 2016; 41(1): 92-128. doi: 10.1007/s11239-015-1309-0.

ACOG Practice Bulletin No. 196: Thromboembolism in Pregnancy. Obstetrics & Gynecology 2018; 132(1): e1-e17. doi: 10.1097/AOG.0000000000002706.