



GRUPO CAHT

GRUPO COOPERATIVO ARGENTINO
DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS

Tromboembolismo y embarazo

TIPS DE INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES

RIESGO DE RECURRENCIA DE ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA DURANTE EL EMBARAZO



Un estudio multicéntrico francés evaluó el riesgo de recurrencia de enfermedad tromboembólica venosa (ETE) durante el embarazo en una cohorte de 189 mujeres con antecedentes de trombosis. Diecisiete pacientes desarrollaron recurrencia trombótica, seis durante el embarazo y 11 en el puerperio. La mayoría de las pacientes con recurrencia trombótica estaban bajo trombopprofilaxis farmacológica. En el análisis multivariado, solo la obesidad se asoció a riesgo de recurrencia. El estudio confirma el alto riesgo de recurrencia trombótica durante el embarazo, aún con trombopprofilaxis y con mayor impacto en el puerperio.

Bibliografía:

de Moreuil C, Tromeur C, Daoudal A y col. Risk factors for recurrence during a pregnancy following a first venous thromboembolism: a French observational study. *J Thromb Haemost*. 2022 Jan 12. doi: 10.1111/jth.15639.