



GRUPO CAHT  
GRUPO COOPERATIVO ARGENTINO  
DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS

# Coagulopatía de la cirrosis

## TIPS DE INFORMACIÓN PARA PACIENTES

### ALTERACIONES EN LA COAGULACIÓN EN LOS PACIENTES CON CIRROSIS



En los pacientes con cirrosis es posible encontrar alteraciones en los parámetros de la coagulación en el laboratorio, como por ejemplo el tiempo de protrombina (TP) o el fibrinógeno, entre otros. Si bien esas alteraciones pueden ocasionar sangrados, en la mayoría de los pacientes **no es necesario administrar medicación** con el objetivo de **prevenir** hemorragias (pacientes asintomáticos). En algunas circunstancias clínicas, como la preparación de procedimientos invasivos o en los sangrados activos, puede considerarse realizar una corrección transitoria de las alteraciones de la coagulación. La atención de estos pacientes requiere de especialistas en el área.

#### Bibliografía:

European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on prevention and management of bleeding and thrombosis in patients with cirrhosis. J Hepatol 2022; 76: 1151-84. doi: 10.1016/j.jhep.2021.09.003.