



GRUPO CAHT
GRUPO COOPERATIVO ARGENTINO
DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS

Promoción del acceso a los recursos en hemostasia y trombosis

TIPS DE INFORMACIÓN PARA PACIENTES

DISPONIBILIDAD DE PROFILAXIS CON HEPARINA EN INSTITUCIONES DE ARGENTINA



Los pacientes internados tienen mayor riesgo de trombosis y ésta es la principal causa de muerte prevenible en la internación. No todos los pacientes hospitalizados necesitan profilaxis para prevenir una trombosis, hay criterios específicos. Cuando está indicado, la forma más frecuente de prevenir la trombosis es con heparina (heparinas de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas). Datos del relevamiento de recursos en hemostasia y trombosis recabados en el año 2022, mostraron que, afortunadamente, más del 90% de los centros cuentan con heparinas de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas para realizar prevención de trombosis. La disponibilidad es alta en las distintas regiones del país.

Grupo promoción del acceso a los recursos en hemostasia y trombosis - CAHT.

Bibliografía:

Vazquez FJ, y col Recomendaciones actualizadas para profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa en Argentina. Medicina, 2020; 80:69-80.

Datos del Relevamiento de la disponibilidad de Recursos de Hemostasia y Trombosis en Argentina-2022. Datos no publicados.