GRUPO CAHT
GRUPO COOPERATIVO ARGENTINO
DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS

Anticoagulantes orales directos (DOACs)

TIPS DE INFORMACIÓN PARA LA COMUNIDAD

CIRUGÍA BARIÁTRICA Y EL USO DE ANTICOAGULANTES ORALES DIRECTOS

La cirugía bariátrica es un tratamiento cada vez más común y eficaz para reducir el peso y prevenir las complicaciones de salud relacionadas con la obesidad.

Los pacientes que se someten a este tipo de procedimiento tienen un mayor riesgo de trombosis y fibrilación auricular durante su vida.

Se utilizan anticoagulantes orales directos para el tratamiento de la trombosis y prevenir accidentes cerebrovasculares.

El problema que se presenta en estos pacientes es la falta de absorción de los anticoagulantes orales directos, conduciendo tanto a un mal tratamiento como a una mala prevención. Es importante que sean evaluados por los médicos hematólogos quienes decidirán en cada caso el tipo de medicamento y controles a seguir.

Bibliografía:
Leong, Russell et al. "Direct oral anticoagulants after bariatric surgery-What is the evidence?." Journal of thrombosis and haemostasis : JTH vol. 20,9 (2022): 1988-2000. doi:10.1111/jth.15823.