



 **GRUPO CAHT**
GRUPO COOPERATIVO ARGENTINO
DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS

Highlights Congreso ISTH 2023 Montreal

TIPS DE INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES

ACL Y / ANTI B2GPI IGM. LABORATORIO. SUBCOMISIÓN DE ANTICOAGULANTE LÚPICO/ANTICUERPOS ANTI- FOSFOLÍPIDOS (APL).



Dentro del registro de APS ACTION (Alliance for Clinical Trials & International Networking) se estudiaron los pacientes que estaban registrados como positivos únicos de ACL/aB2GPI IgM (51) y en comparación con positivos únicos de isotipo IgG (49). Esto indicó que la prevalencia de positividad única en paciente con APL es baja (aproximadamente 5% en ambos isotipos). No se encontraron diferencias significativas entre las características generales de las poblaciones ni en la prevalencia de OAPS, pero analizando las complicaciones trombóticas claramente se vio que la prevalencia de episodios trombóticos era mayor en los isotipo IgG (41%) comparado con los IgM (12%). Por el contrario, la prevalencia de cualquier evento arterial era superior en la población de IgM aislada 62% vs 42% en la población de IgG.

Como proyecto futuro del subcomité se planea realizar estudios de series de casos con positividad aislada de isotipo IgM así como el valor agregado de la positividad IgM en paciente ya positivos para LA o aPL IgG.

Bibliografía:

J Thromb Haemost 2023. doi: 10.1016/j.jth.2023.04.001.