



GRUPO CAHT

GRUPO COOPERATIVO ARGENTINO
DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS

Sangrado

TIPS DE INFORMACIÓN

PARA LA COMUNIDAD

MANEJO PERIOPERATORIO EN PACIENTES CON TRASTORNOS HEMORRÁGICOS RAROS (THR)



Los THR son deficiencias hereditarias de factores de la coagulación y comprenden la deficiencia congénita de los factores (F): FII, FV, FVII, FX, FXI, FXIII y la deficiencia combinada de FV y FVIII. La prevalencia es baja, oscila entre 1/300.000 y 1/3.000.000 dependiendo del factor involucrado. Este conjunto de desórdenes puede diagnosticarse por casualidad o porque se solicita el estudio de coagulación por manifestaciones de sangrados. La severidad de las manifestaciones de sangrado se correlaciona frecuente con niveles muy bajos del factor deficitario (<10%). Los pacientes con THR que serán sometidos a cirugías deben ser evaluados por un equipo multidisciplinario con experiencia en la patología. La sustitución del factor deficitario puede realizarse con hemoderivados o si está disponible concentrados del F. El tratamiento previo no siempre es necesario y va a depender de la severidad del déficit, del riesgo de sangrado de la cirugía y de los antecedentes de sangrado del paciente.

Bibliografía:

Rousseau F y col. Surgery in rare bleeding disorders: the prospective MARACHI study. *Res Pract Thromb Haemost.* 2023;7(7):102199.