PARA LA COMUNIDAD

TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN EN LA LINFOCITOSIS HEMOFAGOCÍTICA/SÍNDROME DE ACTIVACIÓN MACROFÁGICA

La linfocitosis hemofagocítica (HLH) es una condición rara y grave con una incidencia de aproximadamente 1 caso nuevo por cada 800,000 personas al año.

Se produce por una reacción hiperinflamatoria sistémica originada en muchos casos por un agente infeccioso. Los pacientes pueden desarrollar fiebre, agrandamiento del hígado y/o bazo, disminución del recuento de glóbulos rojos y/o blancos y/o plaquetas de la sangre, disfunción de órgano, entre otros.

El diagnóstico puede ser complicado y depende de un conjunto de criterios específicos.

El trastorno de la coagulación es común en estos pacientes y la disminución del fibrinógeno, proteína que contribuye a detener el sangrado, es la anomalía más frecuente. Esta condición se asocia a una mayor mortalidad.

El tratamiento se basa en estudios observacionales y opiniones de expertos.

Bibliografía:
Valade S, Mariotte E, Azoulay E. Coagulation Disorders in Hemophagocytic Lymphohistiocytosis / Macrophage Activation Syndrome. Crit Care Clin. 2020 Apr;36(2):415-426. doi: 10.1016/j.ccc.2019.12.004. Epub 2020 Feb 3. PMID: 32172822.