PARA PACIENTES

TROMBOSIS ASINTOMÁTICAS EN PACIENTES CON CÁNCER

El cáncer aumenta el riesgo de trombosis, y ésta constituye la segunda causa de muerte en los pacientes con enfermedades neoplásicas. En algunas ocasiones, se detectan trombosis en los estudios de rutina de los pacientes con cáncer que no causan síntomas. Por ejemplo, pueden hallarse pequeños trombos en las arterias pulmonares de pequeño calibre cuando se solicita una tomografía de control en el diagnóstico o seguimiento de la enfermedad maligna. Esas trombosis, que llamamos incidentales, también requieren anticoagulación (excepto que exista contraindicación para ello) tal como si fueran sintomáticas.

Bibliografía:
-Conferencia Tromboembolismo incidental. VI educacional de la ISTH en el congreso CAHT 2022. Trombosis en el paciente con cáncer. Dra Susana Viñuales
-https://www.grupocaht.com/libro-de-resumenes-del-xv-congreso-argentino-de-hemostasia-y-trombosis-grupo-caht/
-Ashrani AA, Gullerud RE, Petterson TM, y col. Risk factors for incident venous thromboembolism in active cancer patients: A population based case-control study. Thromb Res. 2016; 139: 29-37. doi: 10.1016/j.thromres.2016.01.002.