PARA PACIENTES

TROMBOPROFILAXIS EN PACIENTES CON CANCER

El paciente con cáncer tiene mayor riesgo de sufrir eventos tromboembólicos, de hecho, el tromboembolismo venoso (TEV) es su segunda causa de muerte. Los factores responsables de este incremento son variables entre los que se pueden nombrar: tipo de cáncer, uso de catéter central para la quimioterapia, o el tipo de terapia utilizada para combatirlo.
El tratamiento anticoagulante establecido para estos pacientes es complejo. Se deben analizar los riesgos trombóticos y hemorrágicos, como así también la interacción de medicamentos, la forma de administración y el grado de avance de la enfermedad. Por lo tanto, los pacientes deben recurrir a su hematólogo, quien analizará todos estos aspectos antes mencionados y decidirá cuál es la terapéutica que mejor se adapta a la realidad del paciente, guiándose, lógicamente, de las recomendaciones dadas por expertos en el tema.

Bibliografía:
Trombosis en el paciente con cáncer. VI Curso Educacional de la ISTH, Sesión V. Libro Educacional del XV Congreso Argentino de Hemostasia y Trombosis, CAHT 2022.

Farge D, Frere C, Connors JM y col. International Initiative on Thrombosis and Cancer (ITAC) advisory panel. 2019 international clinical practice guidelines for the treatment and prophylaxis of venous thromboembolism in patients with cancer. Lancet Oncol 2019; 20: e566-81.