

GRUPO CAHT
GRUPO COOPERATIVO ARGENTINO DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS

Manejo hemostático periope-ratorio/periprocedimiento

TIPS DE INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES

GUÍAS PARA EL MANEJO ANTITROMBÓTICO PERIOPERATORIO (PARTE II)

En el 2022, la ACCP (American College of Chest Physicians) publicó guías clínicas para el manejo antitrombótico perioperatorio. Destacamos algunas recomendaciones:

- **Recomendaciones 8 y 9:** En los pacientes anticoagulados con **dicumarínicos por enfermedad tromboembólica venosa (ETV)**, se sugiere la **terapia puente con heparina SÓLO cuando existe alto riesgo trombótico** (Recomendación condicional, muy bajo nivel de evidencia). En los pacientes con **riesgo bajo y moderado de trombosis, se sugiere EN CONTRA** de la terapia puente con heparina (Recomendación condicional, muy bajo nivel de evidencia).

  Alto riesgo trombótico: Síndrome antifosfolipídico, ETV reciente (menos de 3 meses, en especial menos de 1 mes), trombofilias de alto riesgo y ETV asociado a cáncer de alto riesgo (páncreas, estómago, esófago, cerebro y neoplasias mieloproliferativas).

Bibliografía:

Douketis JD y col. Perioperative Management of Antithrombotic Therapy: An American College of Chest Physicians Clinical Practice Guideline. Chest 2022; 162: e207.